


PROGRAMA NUTRICIONAL DE ARÁNDANOS



 APLICACIONES VÍA FERTIRRIEGO		DOSIS	APLICACIONES	OBJETIVO
Desarrollo vegetativo (inicio de brotación, después de poda a prefloración)	fertifulvat®	20 L/ha	Fraccionar en 4 momentos (5L/ha), de manera semanal, iniciando 3 semanas después de poda	Mantenimiento de raíces después de poda).
	ruter AA®	8 L/ha	Fraccionar en 2 momentos (4L/ha), de manera semanal, iniciando entre 10 a 12 semanas después de poda (inicio de máximo desarrollo radicular).	Promover un óptimo desarrollo radicular.
	tradecorp® AZ	3,0 kg/ha	Aplicar cada 15 días: (1kg/ha), alternando con tradecorp®Zn, 15 días después de brotación.	Proveer los elementos necesarios para que la planta tenga una nutrición balanceada y adecuada. Prevenir deficiencias nutricionales.
	tradecorp® Zn	2 kg/ha	Aplicar cada 15 días: (0,50kg/ha), alternando con tradecorp®AZ, iniciando 1 mes después de brotación.	
	ultraferro®	3 kg/ha	Aplicar cada semana: (0,300 kg/ha), iniciando 1 mes después de brotación.	
	tradecorp® Mg	2 kg/ha	Realizar aplicaciones quincenales desde prefloración.	
Desarrollo reproductivo (desde prefloración a cosecha frutos)	fertifulvat®	20 L/ha	Realizar 4 aplicaciones quincenales desde prefloración	Ampliar el tiempo de desarrollo de raices nuevas luego de floración y mantener las ya formadas.
	tradecorp® AZ V	3 kg/ha	2 aplicaciones: 1era en estadio de yemas hinchadas (3kg/ha), 2da aplicación 30 días después.	Proveer los elementos necesarios para un óptimo reproductivo del cultivo
	tradecorp® Zn	1 kg/ha	Aplicar desde cuajado, de manera semanal 0,3 kg/aplicación.	
Durante la cosecha	tradecorp® AZ V	2 kg/ha	Fraccionar la dosis total en aplicaciones quincenales.	Proveer los elementos necesarios para óptima nutrición durante la cosecha
	ruter AA® ó phylgreen®	8 L/ha 3 L/ha	2 aplicaciones de (4 o 1.5 L/ha), distanciadas 7 días entre sí, a mitad de cosecha.	Promover un óptimo desarrollo radicular.

PROGRAMA NUTRICIONAL DE ARÁNDANOS



 APLICACIONES FOLIARES		DOSIS	APLICACIONES	OBJETIVO
Desarrollo vegetativo (desde brotación a prefloración)	delfan® plus + amino® CaB	300 + 500 ml/200L	Desde brotación (post-poda) y durante el desarrollo foliar o ante situación de estrés abiótico.	Promover desarrollo de yemas de buena calidad. Aporte de suficiente Calcio y Zinc a brotes nuevos.
	phylgreen® + phostrade® Zn	400 + 300 ml/200L	Alternar con aplicación de delfan® plus	
	maxflow® Mg	300 ml/200L	Aplicar semanalmente, desde inicio de brotamiento.	Mantener óptimo contenido de clorofila, para lograr máxima producción de reservas.
Desarrollo reproductivo (desde pre floración a cosecha)	amino® CaB	800 ml/200L	Aplicar quincenalmente, desde preflor a crecimiento de frutos	Óptima nutrición cálcica, y calidad postcosecha de fruto.
	phylgreen® + phostrade® Zn	300 + 300 ml/200L	Aplicar quincenalmente, alternando con amino®CaB, entre preflor y crecimiento de frutos. Luego del inicio de maduración de frutos, continuar con aplicación de phylgreen®.	Óptimo conformación de flor y óptimo cuajado. Aporte energético para el proceso de floración-cuajado (estado crítico).
	aminofert K	800 ml/200L	Desde inicio de maduración de primeros frutos, con frecuencia quincenalmente, alternando con aplicaciones de phylgreen®.	Promover traslocación y llenado de frutos.
Durante la cosecha	phylgreen® B-Mo	500 ml/200L	Durante la cosecha cada 15 días.	Promover traslocación y llenado de frutos; ayudar a tolerar estrés de cosecha.



Av. Nicolás Arriola 314 Of. D-101
Urb. Santa Catalina - La Victoria
Lima - Perú



servicioalcliente@fertitec.com.pe
ventas@fertitec.com.pe
www.fertitec.com



Teléfono: (+511) 223 2023
Móvil: (+511) 943 660 801



/FertitecPerú

